


$P(y|x)$ $x = 23$

$P(x,y)$ $P(x|y)$

$P(x|GR)$ $P(y|GR)$


168,00180%.....




$\hat{y} = \Theta^T x$


$\hat{y} = \varphi(\Theta^T x)$

$\varphi(w) = \begin{cases} 1 & \text{dla } \Theta^T x > 0 \\ 0 & \text{w przec} \end{cases}$






$W = \log_B\left(\frac{P}{1-P}\right)$



$\frac{P}{Q}$ ↘

$OR = \frac{P}{1-P}$


P	OR
0.8	→ 4
0.1	→ 1/9
0.6	← 3/2




$B^W = \frac{P}{1-P}$ $\frac{P-1}{P} = B^{-W}$

$1 - \frac{1}{P} = B^{-W}$ $\frac{1}{P} = 1 - B^{-W}$

$P = \frac{1}{1-B^W}$



Kalibracja modelu
Regresja logist.



$\hat{y} = \varphi(\Theta^T x)$

$p(y|x)$ $\Leftrightarrow \Psi$ dla $\Theta = [a]$

$Q = \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - \frac{1}{1+e^{-ax}}\right)^2$

$\frac{\partial Q}{\partial a} = 0 \to \hat{a}$

czy to się uda?

$y_i = \frac{1}{1+e^{-ax}}$

~~$\log y_i = \log 1 - \log(1+e^{-ax})$~~

$1 + e^{-ax} = \frac{1}{y_i}$

$e^{-ax} = \frac{1}{y_i} - 1$

$-ax = \log\left(\frac{1-y_i}{y_i}\right)$

$ax = \varphi \to \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i y_i}{\sum_{i=1}^{N} x_i^2}$

czy to się uda?